




COVID-19


ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA FARMACIA

¿Qué ES UN CONTACTO ESTRECHO?



Definición Caso Sospechoso Establecido por el COE

DEFINICIÓN DE CASO SOSPECHOSO - 4 de Octubre de 2020



Criterio 1	Criterio 2	Criterio 3
<p>Toda persona (cualquier edad) con dos o más de los siguientes síntomas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fiebre (37.5°C o más) • Tos • Odinofagia • Dificultad respiratoria • Cefalea • Mialgias • Diarrea/vómitos (considerarse como uno) <p>- Sin otra etiología que explique la clínica</p> <p>• Este criterio incluye toda Infección respiratoria aguda grave</p> <p>Ó</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pérdida repentina del gusto o del olfato, en ausencia de cualquier otra causa identificada 	<p>Incluye: - Trabajador de salud - Residente o trabajador de instituciones cerradas o de internación prolongada* - Personal esencial** - Residente en barrios populares o pueblos originarios*** - Contacto estrecho de caso confirmado y que dentro de los 14 días posteriores al contacto presente síntomas.</p> <p>1 o más de estos síntomas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fiebre (37.5°C o más), • Tos, • Odinofagia, • Dificultad respiratoria, • Pérdida repentina del gusto o del olfato. 	<p>Síndrome inflamatorio multisistémico post- COVID19 en Pediatría (OMS): Niños y adolescentes 0 a 18 años con fiebre > 3 días y dos de los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erupción cutánea o conjuntivitis bilateral no purulenta o signos de inflamación mucocutánea (oral, manos o pies). • Hipotensión o shock. • Disfunción miocárdica, pericarditis, valvulitis o anomalías coronarias (ecográficos o elevación de Troponina / NTproBNP). • Evidencia de coagulopatía (elevación de PT, PTT, Dímero-D). • Síntomas gastrointestinales agudos (diarrea, vómitos o dolor abdominal). <p>Y Marcadores elevados de inflamación: VSG –proteína C reactiva o procalcitonina.</p> <p>Y Ninguna otra causa evidente de inflamación (sepsis bacteriana, SS estafilocócicos o estreptocócicos)</p>

*penitenciarias, residencias de adultos mayores, instituciones neuropsiquiátricas, hogares de niñas y niños.

**Personal esencial: Fuerzas de seguridad y Fuerzas Armadas, Personas que brinden asistencia a personas mayores.

*** Barrio popular : aquellos donde la mitad de la población no cuenta con título de propiedad, ni acceso a dos o más servicios básicos.

Contacto Estrecho para trabajadores de Salud



Uso del AIRE ACONDICIONADO en la Farmacia

La ventilación es un factor importante para evitar que el virus que causa el COVID – 19 se propague en espacios interiores; por eso es importante seguir algunas recomendaciones:

Ajustar la temperatura del aire acondicionado entre 24º y 26º. Evitar refrigerar los ambientes a temperaturas muy bajas


Orientar el flujo de aire hacia arriba, evitando que llegue directo a las personas

Ajustar un tiempo concreto: si es posible programar para que se apague cada 10 ó 15 minutos

Realizar la limpieza de los filtros y chequear su funcionamiento por personal especializado

Si es posible, dejar abierto una ventana y/o puerta que permita ventilación natural de aire

La OMS recomienda que se aumente la tasa de ventilación por medios naturales o mecánicos, preferiblemente sin reciclar el aire



Recordar seguir con las medidas preventivas

- ❖ Uso de Barbijo
- ❖ Distanciamiento Social
- ❖ Higiene de manos

Fuente:

COE - <https://www.cba.gov.ar/coe/> -Teléfono: 0800-122-1444

Organización Mundial de la Salud: <https://www.who.int/es/news-room/q-a-detail/q-a-ventilation-and-air-conditioning-in-public-spaces-and-buildings-and-covid-19>